

## **Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para niños, de 5 a 11 años**

La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 es una vacuna de ARNm. ARNm se refiere al material genético del virus que causa COVID-19. Este material genético está en la vacuna. La vacuna le enseña al sistema inmunológico cómo reconocer y combatir el virus que causa COVID-19. Las vacunas COVID-19 no contienen el virus SARS-CoV-2 infeccioso real, por lo que la vacuna no puede darle COVID-19 a su hijo. Esta vacuna de ARNm no afecta el ADN de su hijo.

La vacuna Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años tiene los mismos ingredientes activos que la vacuna que se administra a adultos y adolescentes. Todos los ingredientes de la vacuna COVID-19 son seguros. Casi todos los ingredientes de las vacunas COVID-19 son ingredientes que se encuentran en muchos alimentos: grasas, azúcares y sales. No hay evidencia de que alguna de las vacunas COVID-19 cause problemas de fertilidad.

Los niños de 5 a 11 años reciben una dosis apropiada para su edad creada específicamente para niños y no para adultos y adolescentes. La seguridad de la vacuna en aproximadamente 3,100 niños de 5 a 11 años que recibieron la vacuna no tuvo efectos secundarios graves en un estudio en curso. Se encontró que la vacuna es 90.7% efectiva para prevenir el COVID-19 sintomático en niños de 5 a 11 años.

Su hijo puede tener algunos efectos secundarios, que son signos normales de que su cuerpo está generando protección. Estos efectos secundarios suelen ser temporales y generalmente desaparecen en 48 horas. Puede afectar la capacidad de un niño para realizar las actividades diarias durante 1 a 2 días. Algunos niños no presentan efectos secundarios.

- Dolor, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección, parte superior del brazo
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular
- Cansancio
- Escalofríos y fiebre

### Consejos útiles

Aplique un paño limpio, fresco y húmedo sobre el lugar de la inyección.

Fomente el uso de muchos líquidos: agua y jugos.

Pídale consejo al médico de su hijo sobre el uso de un analgésico sin aspirina y otros pasos que puede tomar en casa para consolar a su hijo. En general, no se recomienda el uso de aspirina en niños y adolescentes menores de 18 años.

Su hijo necesitará una segunda inyección de la vacuna Pfizer-BioNTech tres semanas después de su primera inyección. Las personas se consideran completamente vacunadas 2 semanas después de su segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19.